

TOLACを希望される方

帝王切開後経膣試験分娩（TOLAC）実施にあたり、厳密な適応がある事をご承知ください。

■TOLACの問題点

- ①TOLACは約200例に1例の割合で子宮破裂を
起こすことがあります。

TOLACを実施するにあたっては、その適応を遵守し、
緊急帝王切開のできる体制下で行う必要があります。

- ②陣痛誘発・促進剤を用いた場合、
子宮破裂のリスクが高まります。
よって当院では原則、計画出産は行いません。

オキシトシンの使用は原則、陣痛発来後、分娩進行を確認し、その後微弱陣痛の場合に用います。

既往帝王切開術式別の子宮破裂率 ¹	
(自然陣痛)	0.4%
古典的帝王切開術既往	2~9%
延長切開術既往	1.9%

子宮破裂の相対リスク (帝王切開によるリスクを1とすると)	
自然陣痛発来	3.3
*オキシトシンを用いた陣痛誘発	4.9
プロスタグランジンを用いた陣痛誘発	15.6

- にしじまクリニックでは、以下の条件を満たされた方にのみ、試験分娩（TOLAC）を
試みます。

- ①試験分娩の禁止要件が
ないこと

- ②試験分娩の許可条件を
満たしていること

※妊娠経過中に禁止要件・許可条件が出現して
くることがあります。

よってTOLACを希望された時点ではお受け
しても、その後お断りすることがあります。

- ③家族ともに利益と危険性を理解し、
全て健診・学級を受診することができる、
ご家族の協力が得られる、
上の子を預けられる環境がある

- 以下の点に御留意願います。

- ①TOLAC分娩実施料として5万円を徴収させていただきます。

緊急帝王切開の準備(資材および人員の確保など)のための費用です。

- ②人員が確保できる日の誘発分娩をお願いすることがあります。

TOLAC禁止：あなたはTOLACを行えません

- 前回帝王切開の手術内容が不明
- 子宮創部が一層縫合²
- 2回以上の帝王切開既往
- 前回帝王切開から2年未満の妊娠²
- 延長された子宮切開の既往、または
緊急帝王切開で早産となった方
- 今回児頭骨盤不均衡、巨大児、その他リスク
- 今回妊娠40週以後も子宮頸管が未熟

TOLACの許可条件³

- 上記禁止要件がない
- 本人・家族ともに希望し、利益と危険性を理解して
いる、上の子を預けられる
- 妊娠経過異常なし、当院で全て妊婦健診と両親学級を
全て受けていただく

以下の記載は現時点でTOLAC可能とされた方への説明・同意書です。

■にしじまクリニックにおける試験分娩（TOLAC）の管理

①児の推定体重及び位置（胎位）、胎盤の位置、骨盤エックス線検査などから試験分娩が可能か引き続き判定します。なお妊娠34週に術前検査を行い、予定帝王切開日も設定しておきます。

②原則として妊娠40週まで自然陣発を待ちます。*4,5,6

③40週に至っても自然陣発しない場合には、設定した日に帝王切開を行います。

④分娩時に切迫子宮破裂の症状がみられた場合には、速やかに緊急帝王切開分娩へ移行します。なお、経膈分娩後の子宮破裂にも注意して状態監視を行います。

■以下の場合には緊急帝王切開分娩となります。

①血性羊水や出血、創部痛、肩の痛み、呼吸苦の出現、これらは子宮破裂の可能性が
あります。

②自然陣発入院後に続発性微弱陣痛となった場合、分娩進行が期待できない場合

③24時間以上分娩が遷延した場合

④頸管成熟・子宮口開大が見られない場合

⑤誘発分娩を行っても有効陣痛が付かない場合

⑥胎児心拍（CTG）異常が見られた場合

参考文献：*1 Handbook of obstetric emergencies 108-109、*2 The caesarean section 106-107、*3 ガイドライン産科編 CQ403、
*4 信州医誌, 62(4): 239-244, 2014、*5 仙台市立病院医誌 31, 11-16, 2011、*6 American family physician 83(2): 215-217

にしじまクリニック 院長 殿

私たちは上記について理解しました。

そのうえで処置を受けることに同意します。

また必要と判断された追加処置（緊急帝王切開など）にも同意します。

令和____年____月____日

妊婦患者本人 署名_____

配偶者 署名_____ 緊急連絡先_____ - _____ - _____

親族（続柄：____）署名_____ 緊急連絡先_____ - _____ - _____

*処置を受ける本人と配偶者が同じ戸籍にいない場合、本人の親族による署名が必要です。

2020年7月29日改定